

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DU GENRE *RHYSSEMUS*  
[COL. SCARABÆIDÆ, APHODIINI],

PAR M. G. BÉNARD.

*Rhyssemus bisigillatus* nov. sp.

Insecte d'un noir légèrement brillant, de forme allongée, parallèle, à convexité bien marquée. Tête à sculpture particulière, à surface finement granuleuse en arrière, lisse en avant et présentant quelques protubérances éparses et de formes irrégulières; le front est orné de deux bourrelets arqués obliquement : toutes ces sculptures sont brillantes sur un fond mat. Épistome largement échancré en avant, à angles aigus, denticulés, et à fine bordure antérieure testacée.




Fig. 1.

*Rhyssemus bisigillatus*  
G. Bénard.

Pronotum transverse, garni sur les côtés de soies courtes claviformes d'un jaune testacé; angles antérieurs proéminents, angles postérieurs largement arrondis; sculpture très accusée : 1° sur le bord antérieur, une ligne feutrée d'un jaune testacé; 2° une large bande confuse de protubérances assez brillantes; 3° un sillon assez large nanti de lignes plus ou moins sinueuses; 4° un bourrelet étroit déprimé au milieu; 5° un sillon assez large de même nature que le précédent; 6° un bourrelet étroit semblable au précédent; 7° un large sillon à fond réticulé; 8° trois lignes transversales de gros granules séparées au milieu par un sillon à fond également réticulé. Toutes ces sculptures n'atteignent pas le bord latéral et convergent vers une convexité à surface granuleuse.

Élytres convexes, à côtes beaucoup plus larges que les intervalles; ces côtes présentent à la surface une double série de protubérances brillantes, les internes petites, peu apparentes, les externes, plus fortes, allongées et légèrement obliques. Sillons assez étroits nettement rectilignes et à fond mat.

Métasternum plan et lisse, d'un noir très brillant, à sillon médian fin en avant, plus large et très accusé en arrière.

Arceaux de l'abdomen transversalement et fortement crénelés au milieu et à leur bord postérieur.

Pattes robustes, d'un brun roux; tibias antérieurs fortement tridentés; tibias intermédiaires et postérieurs très carénés; dessous des cuisses intermédiaires présentant une série de gros pores pilifères; enfin, dessous des cuisses postérieures à peu près lisse; premier article des tarses antérieurs aussi long que les deux suivants réunis; premier article des tarses intermédiaires et postérieurs aussi long que les trois suivants réunis.

Long., 4 millimètres.

Afrique Orientale anglaise; Tana River, Guy Babault, 1913.

Par son facies général et surtout par la sculpture des élytres, cet insecte se rapproche du *Rhyssemus Rohani* Bénard; toutefois il en diffère par la sculpture particulière de la tête ainsi que par celle du pronotum.




Fig. 2.

Tête de *Rh. bisigillatus*.